

ASCENSION ST VINCENTS
INTERCAMBIO/RETIRO DE CATÉTER DE DRENAJE
INSTRUCCIONES DE CUIDADO POSTERIOR

¿Quién realizó su procedimiento?:

Instrucciones de cuidado posterior:

- Se aplicará un vendaje sobre el sitio del procedimiento. También se puede aplicar pegamento para la piel en el sitio. Puede retirar el vendaje 24 horas después de su procedimiento; sin embargo, permita que el pegamento se desprenda por sí solo (no lo retire manualmente). Puede ducharse y dejar que el agua fluya sobre el sitio 24 horas después de su procedimiento; sin embargo, no sumerja el sitio en agua (bañera, piscina, jacuzzi o mar) hasta que el sitio haya sanado. No aplique loción/ungüento en el sitio hasta que haya sanado, a menos que se le indique hacerlo.
- Evite la actividad física intensa durante al menos 24 horas; luego aumente su nivel de actividad según lo tolere.
- Si se dejó un catéter de drenaje en el lugar, registre el volumen de líquido drenado por el catéter (salida) cada 24 horas. Comuníquese con el médico que ordenó el procedimiento una vez que la salida disminuya a menos de 10 mL por 24 horas para preguntar sobre la extracción del catéter. Puede recibir instrucciones de enjuague para inyectar 10 mL de solución salina estéril en el catéter cada 12 horas y luego volver a conectar el catéter a la bolsa/bulbo de drenaje.
- Es normal experimentar molestias/dolor y moretones después de su procedimiento. Puede tomar acetaminofén (Tylenol) durante las primeras 6 a 8 horas después de su procedimiento. Después de 6 a 8 horas, puede cambiar a aspirina, ibuprofeno (Motrin) o naproxeno (Aleve) si el acetaminofén no disminuye adecuadamente su dolor. Es seguro tomar aspirina, ibuprofeno o naproxeno dentro de las 6 a 8 horas después de su procedimiento; sin embargo, puede experimentar más moretones si lo hace.
- Comuníquese con Radiología o con el médico que ordenó su procedimiento si tiene alguna inquietud o experimenta cualquiera de los siguientes síntomas después de su procedimiento: sangrado continuo, hinchazón significativa, dolor intenso que no responde a medicamentos de venta libre, signos de posible infección (enrojecimiento significativo o drenaje purulento del sitio, dolor intenso, fiebre o escalofríos), dificultad para respirar y/o dolor en el pecho que sea peor de lo normal para usted, mareos/aturdimiento al ponerse de pie, una frecuencia cardíaca más rápida de lo normal o drenaje alrededor del catéter.
- Días laborables de 8 a. m. a 5 p. m., llame al 308-8401 (Riverside), 296-3886 (Southside), 602-1360 (Clay), 691-1297 (St Johns) o a Optimal Imaging (450-6960). Días laborables de 5 p. m. a 10 p. m. o fines de semana de 6 a. m. a 10 p. m., llame al 308-8401. Fuera de estos horarios, llame al operador del hospital al 308-7300 y solicite hablar con el Radiólogo Intervencional de turno.
- Llame al 911 o pida a alguien que lo lleve a la sala de emergencias más cercana si presenta síntomas graves o significativos.