

**ASCENSION ST VINCENTS**  
**COLOCACIÓN DE CATÉTER DE DRENAJE**  
**INSTRUCCIONES DE CUIDADO POSTERIOR**

**¿Quién realizó su procedimiento?:**

---

**Instrucciones de cuidado posterior:**

- Se aplicará un vendaje sobre el sitio del procedimiento. Cambie el vendaje según sea necesario y después de que se moje. Puede ducharse y dejar que el agua fluya sobre el sitio 24 horas después de su procedimiento; sin embargo, no sumerja el sitio en agua (bañera, piscina, jacuzzi o mar) hasta que se haya retirado el drenaje y el sitio haya sanado. No aplique loción/ungüento en el sitio hasta que haya sanado, a menos que se le indique hacerlo.
- Evite la actividad física intensa durante al menos 24 horas; luego aumente su nivel de actividad según lo tolere.
- Es normal experimentar molestias/dolor y moretones después de su procedimiento. Puede tomar acetaminofén (Tylenol) durante las primeras 24 horas después de su procedimiento. Después de 24 horas, puede cambiar a aspirina, ibuprofeno (Motrin) o naproxeno (Aleve) si el acetaminofén no disminuye adecuadamente su dolor.
- Registre el volumen de líquido drenado por el catéter (salida) cada 24 horas. Comuníquese con el médico que ordenó el procedimiento una vez que la salida disminuya a menos de 10 mL por 24 horas para preguntar sobre la extracción del catéter. Puede recibir instrucciones de enjuague para inyectar 10 mL de solución salina estéril en el catéter cada 12 horas y luego volver a conectar el catéter a la bolsa/bulbo de drenaje.
- Comuníquese con Radiología o con el médico que ordenó su procedimiento si tiene alguna inquietud o experimenta cualquiera de los siguientes síntomas después de su procedimiento: sangrado continuo, hinchazón significativa, dolor intenso que no responde a medicamentos de venta libre, signos de posible infección (enrojecimiento significativo o drenaje purulento del sitio, dolor intenso, fiebre o escalofríos), dificultad para respirar y/o dolor en el pecho que sea peor de lo normal para usted, mareos / aturdimiento al ponerse de pie, un ritmo cardíaco más rápido de lo normal o drenaje alrededor del catéter.
- Días laborables de 8 a. m. a 5 p. m., llame al 308-8401 (Riverside), 296-3886 (Southside), 602-1360 (Clay), 691-1297 (St Johns) o a Optimal Imaging (450-6960). Días laborables de 5 p. m. a 10 p. m. o fines de semana de 6 a. m. a 10 p. m., llame al 308-8401. Fuera de estos horarios, llame al operador del hospital al 308-7300 y solicite hablar con el Radiólogo Intervencional de turno.
- Llame al 911 o pida a alguien que lo lleve a la sala de emergencias más cercana si presenta síntomas graves o significativos.

**¿Cómo recibo los resultados del procedimiento?**

- Algunos procedimientos de drenaje producen muestras que se envían para análisis de laboratorio. Los resultados pueden tardar hasta 5 días en estar disponibles. Comuníquese con la oficina de su médico para obtener los resultados y las instrucciones de seguimiento.